



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

ILE DE FRANCE

Bulletin Technique n° 22 du 7 juillet 2009 - 1 page

Actualité

Stades

MAIS : 10-12 feuilles à sortie des panicules.
TOURNESOL : la floraison a démarré.

Pyrale maïs

Les captures restent très faibles sur certains sites, et ont fortement augmenté pour d'autres, ce qui permet à la courbe moyenne de vol de décoller enfin (voir graphique).

Les toutes premières pontes ont été détectées (Chateau Landon et Brie Comte Robert-77), ce qui pourrait amener les premières éclosions en fin de semaine - début de semaine prochaine. On retrouve une situation à l'ancienne, avec un risque pyrale autour du 14 juillet.

Pour mémoire, si les populations larvaires à l'automne 2008 étaient en baisse, on avait localement dans le Val d'Oise et les Yvelines des sites autour de 1 larve par pied.

Pucerons

Les populations de pucerons sur maïs, toujours principalement de l'espèce *Métopolophium dirhodum*, restent encore conséquentes dans certaines parcelles (100 à 200 pucerons par pied), avec une localisation désormais sur les feuilles supérieures. Les auxiliaires sont toutefois de plus en plus nombreux (larves et adultes de coccinelles, larves de syrphes).

A surveiller l'évolution des populations sur panicules suite à d'éventuels traitements chimiques contre la pyrale.

Sur féverole, on note depuis 10 jours un développement de pucerons verts (et quelques roses), à la face inférieure des dernières feuilles, et parfois sur gousses. Les populations peuvent atteindre plusieurs dizaines de pucerons dans les cas les plus touchés. Ce développement tardif de pucerons verts a déjà été observé en 2005, 2006 (en lien avec les traitements bruches) et plus localement l'an passé. A ce stade, la pu-

sibilité est limitée. Des auxiliaires sont parfois présents.

Présence également de pucerons dans des parcelles de betteraves et de tournesol, mais ces cultures ne sont plus sensibles aux stades actuels.

Betterave

Les **noctuelles** restent le principal ravageur actuellement présent dans la région. Présence également de quelques chenilles de **teigne** (ex Larchant-77, Abbeville la rivière-91...). Activité modérée des **pégomyies**, sauf dans quelques situations locales (Episy, Larchant-77...).

Seuils :

10% plantes avec chenilles de teigne,

50% plantes avec des perforations de noctuelles


Les premières taches de **cercosporiose** ont été détectées dans le réseau inter-organismes (ITB, SRAL, Fredon, Chambre Agriculture Ile de France, GRCETA et sucreries Souppes et Nangis). Cela confirme la tendance des dernières années d'une arrivée beaucoup plus précoce qu'auparavant (plutôt en août dans les années 80 et 90) de cette maladie.

Le seuil d'intervention pour cette maladie de 5% de feuilles touchées, n'est pas encore atteint.

Tournesol

Présence occasionnelle de noctuelles, sans grande incidence.

Captures moyennes de pyrale
réseau SRAL - Fredon - Chambre IDF



Direction Régionale et
Interdépartementale
de l'Alimentation,
de l'Agriculture
et de la Forêt.

Service Régional de
l'Alimentation
ILE DE FRANCE
18 avenue Carnot
94234 CACHAN
Tél : 01.41.24.18.00
Fax : 01.41.24.18.32

Bulletin réalisé avec la
participation de la
FREDON Ile de France

Imprimé à la station
D'Alertes
Agricoles de Rungis
Directeur gérant :
S. HOFFERER

Publication périodique
C P P A P
n°0909 B 07113
ISSN n°0767-5542

Tarifs individuels 2009:
87 euros (papier)
76 euros (fax)
68 euros (mail)